

Esquema nacional de vacunación, Honduras 2021

Vacuna	Edad de aplicación						
	Recién nacido	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años
Niños							
BCG ¹	Dosis única						
Hepatitis B pediátrica ²	Dosis única						
Poliovirus Inactivada (VPI)		1era dosis	2da dosis				
Polio oral (VOP o Sabin) ³				3era dosis		Refuerzo	
DPT-HepB-Hib (Pentavalente)		1era dosis	2da dosis	3era dosis			
Rotavirus ⁴		1era dosis	2da dosis				
Neumococo conjugada		1era dosis	2da dosis	3era dosis			
SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) ⁵					1era dosis	2da dosis	
Hepatitis A					Dosis única		
DPT						1er Refuerzo	2do Refuerzo
Adolescentes y adultos							
Hepatitis A	Grupos en riesgo: Trabajadores de la Salud						
	Primer contacto: 1era dosis						
	6 meses después de 1era dosis: 2da dosis						
Hepatitis B	Grupos en riesgo:						
	Primer contacto: 1era dosis						
	Un mes después de 1era dosis: 2da dosis						
	6 meses después de 1era: 3era dosis						
Pacientes en diálisis y víctimas agresión sexual: 4 dosis							
Td (Toxoide tetánico difterico)	11 años: Refuerzo y luego 1 dosis cada 10 años						
	Embarazadas no vacunadas:						
	Primer contacto: 1era dosis						
Tdap (Toxoide tetánico, difterico y vacuna antipertussis acelular)	Embarazadas: una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina Otros grupos en riesgo: Trabajadores de Salud, una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina						
VPH (Virus del Papiloma Humano)	Adolescentes mujeres de 11 años: Primer contacto: 1era dosis 6 meses después de 1ra dosis						
Grupos en riesgo							
	2da dosis: 4 meses						

DT pediátrica ⁶	3era dosis: 6 meses
	Refuerzo: 18 meses
	Refuerzo: 4 años
Poliovirus Inactivada (VPI)	1era dosis: 2 meses
	2da dosis: 4 meses
	3era dosis: 6 meses
SRP (Sarampión y Rubéola y Parotiditis) con la cepa Jeryl Lynn	Una dosis a mayores de 5 años de edad no vacunados.
Influenza ⁷	Población de 6 a 23 meses y enfermos crónicos de 2 a 59 años: Dosis anual en población de 6 meses a 8 años y aplicar 2da dosis con intervalo de 1 mes después de la primera dosis si previamente no ha sido vacunado.
	Trabajadores de la salud, trabajadores de granjas avícolas, embarazadas y adultos mayores de 60 años dosis única anual
Fiebre Amarilla ⁸	Dosis única mayores de 1 año de edad (viajeros a zonas en riesgo de transmisión).
COVID-19	Trabajadores de salud, mayores de 60 años, población con comorbilidades de 18 a 59 años y trabajadores esenciales. El número de dosis e intervalo varía de acuerdo al fabricante de la vacuna.

1.- BCG: Administrar a recién nacidos con peso mayor o igual a 2,500 gramos.

2.-Hepatitis B pediátrica: Administrar a recién nacidos no patológicos independiente del peso al nacer. independientemente de su estado vacunal.

4.-Rotavirus: Primera y Segunda dosis aplicar a partir de los 2 meses de edad hasta menores de un año.

5.- SRP: También se aplica cada 4 años en campañas de seguimiento, en 2021 se aplicará a población de 1 a 5 años, 11 meses, 29 días de edad.

6.-DT pediátrica: aplicarla a niños con reacción adversa severa al componente Pertussis de la vacuna combinada DPT-HepB-Hib.

7.-Influenza: administrar 2 dosis separadas por un intervalo de 4 semanas a niños de 6 meses a 8 años, quienes estan recibiendo la vacuna por primera vez y quienes previamente fueron vacunados aplicar una dosis.

8.Paises en riesgo de transmision: Centro América: Panamá, Caribe: Trinidad y Tóbagó, America del Sur:Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa,Guyana, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela y Africa: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Republica Centroafricana, Republica Democratica del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudan, Sudan del Sur, Togo y Uganda.